GRASAS Y ACEITES

OBTENCIÓN

REFINACIÓN: Química y física

ACEITES DE OLIVA, SEMILLAS y de origen animal

HIDROGENACIÓN

CARACTERÍSTICAS PLÁSTICAS

Dra. Margarita Olivera Carrión

IMPORTANCIA DE GRASAS Y ACEITES

- Nutricional
- Tecnológico
- Características organolépticas
- Legislación

TIPOS DE DETERIOROS DE LÍPIDOS

HIDROLISIS	AUTOXIDACIÓN U OXIDACIÓN QUÍMICA	DETERIORO TÉRMICO
<ul style="list-style-type: none">- Enzimática- Química	<ul style="list-style-type: none">- Química- Enzimática	<p>Hidrólisis y oxidación</p>

COMPOSICIÓN DE GRASAS:

- TRIGLICERIDOS / di y monoglicéridos
- ÁCIDOS GRASOS

- FOSFOLÍPIDOS
- CERAS

- VIT. LIPOSOLUBLES
- ESTEROLES: col / fitoest.
- HIDROCARBUROS

- CONTAMINANTES

INSAPONIFICABLE

FUENTES

ACEITES

- **Vegetal:**
 - **oleaginosas**
 - **semillas/frutos**
 - **subproductos**
 - **Cereales**
 - **Frutas secas**
 - **otros**
- **Animal:**
 - **pescados**
 - **cerdos**

GRASAS

- **Vegetal:**
 - **coco, palma (mantecas vegetales)**
- **Animal:**
 - **manteca (mantequilla)**
 - **grasas vacunas / porcinas**

- **MODIFICACIÓN:**
 - **hidrogenación**
 - **inter / trans-esterificación**
 - **cristalización fraccionada**

A&G VEGETALES obtenidos a partir de: granos / frutos oleaginosos

FRUTOS:

- Contenido de agua
- Daño mecánico
- Vida útil postcosecha

SEMILLAS

- Humedad del grano
- " " relativa
- Temperatura
- Injuria del grano
- Insectos
- Microorganismos
- Enzimas

A&G de ORIGEN ANIMAL:

- Contenido de agua
- Ausencia de antioxidantes naturales
- Acidez libre inicial
- Animales marinos: enzimas proteolíticas

CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS:

- HUMEDAD: VALOR CRÍTICO → SECADO
- TEMPERATURA
- INJURIAS
- HISTORIA PREVIA SEMILLA
- ATMOSFERA CONTROLADA

Índices de Calidad para Comercialización de granos

- CONTENIDO GRASO
- ACIDEZ LIBRE DE LA GRASA
- HUMEDAD
- SUSTANCIAS EXTRAÑAS

PROCESOS OBTENCIÓN ACEITES:

Prensado

Aceite de prensa

aceite virgen

**prensa hidráulica
tornillo sinfín**

Extracción por solvente

Desolventizado

Aceite crudo

**Hexano contracorriente
desolventizado**

COMBINADO

PRENSADO

14

a) 1500 1700 2100

Extracción por solvente

b) POR EXTRACCION CON SOLVENTES

Extractor Hildebrandt

Extractor Deotto

Procesos

Los Aceites comestibles, con la sola excepción de los aceites vírgenes, definidos en este capítulo, deben haber sido convenientemente refinados, a través de procesos tecnológicamente adecuados, a fin que cumplan con las exigencias del presente Código. (CAA Art. 525 - Vigencia a partir del 20 febrero 2008)

Aditivos

Prohibido adicionar: **substancias extrañas destinadas a dar sabor, aroma, color o modificar sus caracteres fisicoquímicos**

Podrán ser adicionados, **de los antioxidantes autorizados**, con la exclusión de los aceites de presión no refinados

Productos no aptos para el consumo

Características del aceite

- cuya ACIDEZ LIBRE sea superior a 0,60 mg KOH/g (0,30 ácido oleico)
- OLOR Y SABOR EXTRAÑOS Y/O RANCIO, cuyos índices de peróxido sean superiores a los permitidos
- CONTENGAN ACEITES DE ORIGEN MINERAL.
- ácido erúxico > 5% referido a los AG totales.

Contaminantes

- A y GV refinados que contengan restos de sustancias empleadas en los procesos de refinación > a
 - o Cobre: Vírgenes 0,4 mg/Kg como Cu
Refinados 0,1 mg/Kg como Cu
 - o Cromo: 0,05 mg/Kg como Cr
 - o Hierro: 1,5 mg/Kg como Fe
 - o Jabón: 50 mg/Kg como oleato de sodio
 - o Mercurio: 0,05 mg/Kg como Hg
 - o Plomo: 0,1 mg/Kg como Pb
 - o Solvente de Extracción: 50 mg/Kg
 - o Sustancias Insolubles en Éter Etilico: 500 mg/Kg
- extraídos con solventes no autorizados

REFINACIÓN QUÍMICA

PROCESO	Tratamiento	Productos eliminados	Prod. pausibles de formación
Desgomado ↓	H ₂ O H ₃ PO ₄	Fosfolípidos CH / Prot. Clorofila	Prod. hidratados no grasos
Neutralización	NaOH	AG libres Fosfolípidos Pigmento	Jabones sódicos
Lavado ↓	H ₂ O	Restos de jabón	
Secado ↓	Calor	H ₂ O	
Decoloración ↓	Tierras absorb	Pig / Peróxidos	
Desodorización ↓	Calor – Vacío Arrastre vapor Alta Temp Vacío	Peróx/ AG libres Prod. Descomposi. Pigmentos Esterol/Tocof/Vit	- Hidroc aromát - PUFA conj. Isómeros Trans
Winterizado ↓	Frío	TG alto P.M. Ceras	
Fraccionamiento ↓			
Aceite refinado

REFINACIÓN FÍSICA DE ACEITES

PROCESO	Tratamiento	Productos eliminados
<p style="text-align: center;">Desgomado</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p style="text-align: center;">H₂O H₃PO₄</p>	<p style="text-align: center;">Fosfolípidos CH Proteínas Clorofila</p>
<p style="text-align: center;">Decoloración</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p style="text-align: center;">Tierras absorbentes Calor – Vacío</p>	<p style="text-align: center;">Pigmentos (clorofila, carotenos, xantofilas) Peróxidos</p>
<p style="text-align: center;">Desodorización Neutralización</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p style="text-align: center;">Destilación por arrastre c/vapor de H₂O Alta Temp. Vacío</p>	<p style="text-align: center;">AG libres Aromas y Comp. volát. Insaponificable (pigmentos- esteroles-tocoferoles- vitaminas)</p>
<p style="text-align: center;">Filtración</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Aceite refinado</p>		

- **CLASIFICACION**

- **1. ACEITE DE.....: proviene de una sola especie vegetal.**

Se admitirá la presencia de otro aceite comestible en una proporción máxima del 5,0% en peso, excepto oliva

- **2. Aceite vegetal comestible MEZCLA: constituido por la mezcla de 2 o más aceites de diferentes especies vegetales, en una proporción superior al 5%.**

La representación gráfica del olivo o de sus frutos, o de cualquier otra especie vegetal, sólo podrán usarse en los rótulos, publicidad de una sola especie vegetal.

ACEITE DE OLIVA

Recolección frutos → remoción hojas → lavado → Molienda (molturación) → batido (28-32°C)

ACEITE DE OLIVA : CLASIFICACIÓN

Art. 533 CAA

:	Ac. libre ac. oleico/100g	Ind. Perox max.meq O2/Kg	Abs. UV Max	Denominación Ac. de oliva...
AOVIRGEN			232 270	
AOV extra	0,8	20	2,5 0,22	Extravirgen
AOVirgen	2,0	“	2,6 0,20	Virgen
AOV corriente	3,30	“	- 0,30	Virgen Corriente
AO refinado	0,3	5	1,10	Ac. oliva refinado
Ac. oliva (virgen + ref)	1,0	15	0,90	Ac. de oliva
orujo refin. Art.536	0,3	20		Ac. de orujo de aceituna refinado.

CAA: Ac. oliva lampante: acidez > 3,3 g/100g.

No apto para consumo humano, deber refinarse

La composición de AG determinada por CG (% ésteres metílicos) debe encontrarse:

- **Ácido láurico (C 12:0): No perceptible.**
- **Ácido mirístico (C14:0): Menor que 0,1.**
- **Ácido palmítico (C16:0): 7,5 – 20,0**
- **Ácido palmitoleico (C16:1): 0,3 – 4,0**
- **Ácido heptadecanoico (C17:0): Menor que 0,5**
- **Ácido heptadecenoico (C17:1): Menor que 0,6**
- **Ácido esteárico (C18:0): 0,5 a 5,0**
- **Ácido oleico (C18:1): 53,0 a 83,0**
- **Ácido linoleico (C18:2): 3,5 a 21,0**
- **Ácido linolénico (C18:3): Menor que 1,5**
- **Ácido araquídico (C20:0): Menor que 0,8**
- **Ácido behénico (C22:0): Menor que 0,2.**
- **Ácido lignocérico (C24:0): Menor que 0,1.**

ACEITE DE PALMA

- Humedad elevada
- Lipasas muy activas
- Daño recolección

Aceite de girasol: obtenido de semillas de variedades de *Helianthus annuus* L.

1) **AG refinado:**

Insaponificable, Máx: 1,00%

Índice de peróxido, Máx: 10,0 miliequivalentes de Oxígeno/Kg

2) **AG virgen** al extraído por procedimientos mecánicos. No se permite el uso de aditivos alimentarios (idem AO virgen) - 2008

Insaponificable, Máx: 1,50%

• Índice de peróxido, Máx: 15,0 miliequivalentes de Oxígeno/Kg

• AL: máx 4,00 mg KOH/g (2% como ácido oleico).

• AG trans, máx. 0,1% total AG

3) **AG alto oleico:** $\geq 75\%$ total AG

Cambian índices de genuinidad, II (Wijs): **82 a 91**

4) **AG Alto Esteárico-Alto Oleico (AEAO):**

ácido oleico $\geq 60\%$

ácido esteárico $\geq 15\%$ total AG

GRASAS de ORIGEN ANIMAL

Separadas de tejidos grasos y partes adiposas limpias e inalteradas de **bovinos, ovinos, porcinos o caprinos**.

Grasas vírgenes: las separadas exclusivamente por **procedimientos mecánicos y/o térmicos (excluida la fusión por fuego directo)**,

Denominación: **manteca de cerdo, grasa de cerdo, primer jugo ovino, grasa bovina, o similar.**

Grasas refinadas: refinación de GV si $IP < 20,0 \text{ meq O}_2 / \text{kg}$

Denominación: **+ refinada**

Proceso obtención INMEDIATO :

- Agua
- Ausencia Antioxidante Naturales
- Acidez Libre Inicial
- Animales Marinos: Enzimas Proteolíticas

Proceso Seco:

Deshidratación

Prensado

Proceso Húmedo:

Fusión en agua caliente

Centrifugación

GRASAS BOVINAS U OVINAS

- “Primer jugo” bovino u ovino: obtenidos de tejidos y partes adiposas limpias por fusión a no más de 80 °C

- Grasas bovinas u ovinas

Contenido en impurezas:	Primer Jugo	Grasa
Insolubles éter de petróleo	Máx. 0,05 %	0,50 %
Acidez libre (ácido oleico)	Máx. 0,80 %	1,00 %
Insaponificable	Máx. 1,00 %	1,20 %

- Oleomargarina / oleoestearina:

Productos de la separación por cristalización y prensado de grasas o primer jugo:

Punto de fusión: oleomargarina	P.F máx. 36 °C (óleo oíl)
oleoestearina	Título mín. 46 °C

Canola Oil	8g	20g	10g	62g
Sunola Oil	10g	8g		82g
Safflower Oil	9g	77g		14g
Sunflower Oil	11g	66g	← Trace	23g
Olive Oil	14g	10g	← Trace	76g
Corn Oil	14g	52g	← 2g	32g
Soyabean Oil	15g	54g	8g	23g
Peanut Oil	19g	34g	← 2g	45g
Cottonseed Oil	26g	58g		16g
Palm Olein	49g	12g	← Trace	39g
Tallow	50g	2	1	47g*
Palm Oil	51g	10g	← Trace	39g
Butter Fat	64g	2	1	33g*
Coconut Oil	91g		2	7g

Ac. graso	Sebo vacuno	Mant. de cerdo	Sebo cordero
12 : 0	0	0,5	0
14 : 0	3	2	2
14 : 1 ω 9	0,5	0,5	0,5
16 : 0	26	21	24
16 : 1 ω 9	3,5	3	4
18 : 0	19,5	28	14
18 : 1 ω 9	40	37	43
18 : 2 ω 6	4,5	4	9
18 : 3 ω 3	0	0	1
20 : 0	0	0,5	0,5
20 : 1 + 20 : 2	0	0,5	2
Otros	3	3	0

CARACTERÍSTICAS

TECNOLÓGICAS:

Funcionalidad:

Plasticidad: moldeado

Consistencia: resistencia

Estabilidad

Disponibilidad y costo

ORGANOLEPTICAS:

■ Textura: Palatabilidad

■ Flavor: sabor, olor

■ Aspecto

■ Estabilidad

- Propiedades funcionales de las grasas
- AG: estructura química y comportamiento físico. Tipos de cristales grasos. Polimorfismo.
- Grasas Plásticas. Curvas de sólidos
- Procesos de modificación: hidrogenación, inter-transesterificación, cristalización fraccionada
- AG Trans
- Shortenings. Elaboración de margarinas. Sustitutos de manteca de cacao, crema y otras grasas

¿Cómo se encuentran en los alimentos formulados?

- Emulsiones:
 - Helados; mayonesas
 - Mantecas
 - Emulsiones cárnicas
- Unidos a otros componentes matriz alimentaria:
 - Productos panadería
- Confitería: chocolates y sustitutos

FIGURE 6.

Structure of a typical fat-continuous food such as butter or margarine

Liquid oil

Solid fat crystals

Water drops (acidified fat-free milk)

Comportamiento durante la fusión (curva de sólidos)

1) Composición química

Punto de fusión:

- saturados / insaturados
- cis / trans
- P.M.
- Disposición en el TG

Acido oléico
C18:1 9c
PF: 13°C

Acido elaidico
C18:1 9t
PF: 44°C

Acido esteárico
C18:0
PF: 72°C

P.F.: dobles enlaces y PM

F. A.	M. P. (0C)
	60
16:0	
16:1	1
18:0	63
18:1	16
18:2	-5
18:3	-11
20:0	75
20:4	-50

ACIDOS GRASOS

GRUPO	NOMBRE COMUN	ESTRUCTURA QUIMICA	P.F. (°C)	FUENTES TIPICAS (Aceites y Grasas)	
S	Butirico	4	B	-7.9	Manteca
	Caproico	6	H	-3.4	Manteca
	Caprilico	8	α	16.7	Coco
	Caprico	10	D	31.6	Coco
	Laurico	12	La	44.2	Coco
	Miristico	14	M	54.4	Manteca, coco
	Palmitico	16	P	62.9	Grasas y aceites
	Estearico	18	E (S)	69.6	Grasas y aceites
	Araquidico	20	Ad	75.4	Mani
	Behenico	22		30.0	Mani
M	Caproleico	10ω1		-	Manteca
	Lauroleico	12ω3		-	Manteca
	Miristoleico	14ω5		-	Manteca
	Palmitoleico	16ω7	P ₀	-	Pescado, vacuno, oliva
	Oleico	18ω9	O	16.3	Grasas y aceites
	Elaídico	18ω9 trans		43.7	Manteca, vacuno
	Vaccenico	18ω7 trans		44.0	Manteca, vacuno
	Gadoleico	20ω11		-	Pescado
Erucico	22ω9	E	-	Colza, canola	
P	Linoleico	18ω6-9	L	-6.5	Aceites veg.
	Linolenico	18ω3-6-9	L ₃	-12.8	Lino, soja, canola
	Araquidonico	20ω6-9-12-15	A ₂₂	-49.5	Vacuno
	EPA	20ω3-6-9-12-15		-	Pescado
	DHA	22ω3-6-9-12-15-18		-	Pescado

90 P.F

} TCM

} TCM

— — —

— — —

P
A
C
U

F y U¹

(1) Frutas y verduras.

S U

CLA: 9 cis 11 trans
C18:2

— 10 trans 12 cis

Composición química: Disposición AG en el TG

Tabla 3.15 Resultados de análisis estereoespecíficos^a.

<i>Grasa</i>	<i>Posi- ción</i>	<i>16:0</i>	<i>18:0</i>	<i>18:1 (9)</i>	<i>18:2 (9, 12)</i>	<i>18:3 (9, 12, 15)</i>
Caca- huate	1	13,6	4,6	59,2	18,5	—
	2	1,6	0,3	58,5	38,6	—
	3	11,0	5,1	57,3	18,0	—
Soja	1	13,8	5,9	22,9	48,4	9,1
	2	0,9	0,3	21,5	69,7	7,1
	3	13,1	5,6	28,0	45,2	8,4
Cacao	1	34,0	50,4	12,3	1,3	—
	2	1,7	2,1	87,4	8,6	—
	3	36,5	52,8	8,6	0,4	—
Hígado (rata)	1	19,0	2,53	6,2	5,3	—
	2	1,2	0,2	13,0	18,0	—
	3	6,0	0,8	14,0	10,0	—

^a En la tabla no se indican los ácidos grasos totales que existen en la grasa.

Table 3.8. Average fatty acid and triacylglycerol composition (weight-%) of cocoa butter, tallow and borneo tallow (a cocoa butter substitute)

	Cocoa butter	Edible beef tallow	Borneo tallow ^a
16:0	25 -	36	20
18:0	37	25	42
20:0	1		1
18:1 (9)	34	37	36
18:2 (9, 12)	3	2	1
SSS ^b	2	29	4
SUS	81	33	80
SSU	1	16	1
SUU	15	18	14
USU		2	
UUU	1	2	1 -

^a cf. 14.3.2.2.3

^b S: Saturated, and U: unsaturated fatty acids.

FIGURA 5.5. Curvas de enfriamiento de dos grasas. A: Grasa poco compleja en la que predominan 2 triglicéridos. B: Grasa muy compleja con muchos triglicéridos no predominantes. Los tramos horizontales corresponden a los tiempos de cristalización de triglicéridos puros o muy semejantes.

FIGURA 5.7. Curvas que relacionan la proporción de fase sólida con la temperatura, para las dos grasas A y B de la Figura 5.5.

Comportamiento durante la fusión (curva de sólidos)

Estructura cristalina - POLIMORFISMO GRASAS

- Característica: la misma grasa con igual composición química, puede presentar distintos P. F.
- FORMAS CRISTALOGRAFICAS:
 - α β' β Más usual : β'

Manteca de Cacao - 80% triglicéridos disaturados

EOE = 20%

POE = 55%

POP = 5%

POE determina la textura de la manteca de cacao

POE forma cristalinas:

Alpha 17° C

Beta Prima 27° C

Beta 35.5°C

Beta prima forma estructura pequeños cristales que provocan el bloom

Alpha

Beta-Prime

Beta

Alpha

Beta Prime

Beta

Curva de sólidos - grasas plásticas

CHART 4.2. Solids/Liquid relationships.

CHART 4.3. Basestock effect.

Curva de sólidos

Contenido de grasa sólida en los productos con aceite hidrogenado.

Procesos de modificación de las características plásticas

- Métodos Químicos
 - Hidrogenación (Trans)
 - Inter / Transesterificación
- Métodos Físicos
 - Cristalización Fraccionada

Hidrogenación

- Saturación parcial o total con H de los dobles enlaces
- Objetivos:
 - Transformar Aceites Líquidos en Grasas Semisólidas o plásticas
 - Aumentar la estabilidad de aceites muy insaturados
- Productos:
 - A. G. Sat
 - A. G. Trans
 - Vit A
 - Vit E
 - Esteroles

NUTRICIONAL: se comportan como A. G. Saturados
ROTULADO NUTRICIONAL: deben ser informados

Etapas de la hidrogenación

Etapas de la hidrogenación

(B)

(C)

(D)

(F)

(E)

Factores que determinan hidrogenación

Relación entre las condiciones del proceso y productos obtenidos

		Selectividad	<i>Trans</i>	Vel reacción
Temperatura	↑	↑	↑	↑
Presión	↑	↓	↓	↑
Agitación	↑	↓	↓	↑
Catalizador	↑	↑	↑	↑

Hidrogenación: proceso

Cambios químicos hidrogenación

Hidrogenación Soja

Hidrogenación

En general :

Ácidos Grasos Saturados

Ácidos Grasos Monoinsaturados

Ácidos Grasos *Trans*

Ácidos Grasos Poliinsaturados

Ácidos Grasos *Trans*

Punto de fusión

Cristalización β'

Contenido de sólidos (SFC)

	Canola	
	non-hydrogenated	lightly hydrogenated
<i>Fatty acid composition</i>		
C16:0 palmitic	4	4
C18:0 stearic	2	4
C18:1 oleic	60	80
C18:2 linoleic	22	8
C18:3 linolenic	10	2
Iodine Value	115	90
Stability		
Frying	--	good
AOM hours	15	75
Pourability	Yes	Yes

CAA: LIMITE AG TRANS

“El contenido de **AG trans de producción industrial** en los alimentos no debe ser mayor a:

2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y

5% del total de grasas en el resto de los alimentos.

Estos límites **no se aplican a las grasas provenientes de rumiantes, incluyendo la grasa láctea.”.**

Plazo de adecuación:

- hasta **2 años** para aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo
- hasta **4 años** para los demás alimentos

Cap– II. Art. 155 tris – (Res. Conjunta SPReI y SAGyP N° 137/2010 y N° 941/2010).

Inter - Transesterificación

- **Proceso de modificación de aceites y grasas en que los ácidos grasos permanecen inalterados y son redistribuidos aleatoriamente en las moléculas glicéricas, creando nuevas estructuras.**
- **Altera el rango de plasticidad y el perfil de sólidos**
- **Tipos: química y enzimática**

Interesterificación

Alternativa al proceso de hidrogenación parcial

No promueve la isomerización de dobles enlaces

No afecta el grado de saturación

Uso actual: interesterificación de mezclas de aceites vegetales totalmente hidrogenados o fracciones saturadas con aceites líquidos.

Mecanismo de Trans-esterificación

Transesterificación de Triglicéridos: AAA + BBB

Interesterificación

Proceso de Interesterificación

Puntos de fusión de aceites y grasas interesterificados

Aceite	Antes	Después
Soja	-7,0	9,9
Algodón	11,5	34,0
Coco	26,0	28,2
Palma	39,8	47
Palmiste	28,3	26,9
75% soja + 25% soja hidrogenada	60.0	33,2

Cristalización fraccionada

- Proceso físico por medio del cual los triglicéridos son separados en dos o más fracciones.
- Proceso reversible.
- **Método: Enfriamiento y Separación de las Grasas que precipitan**

• Implica una cristalización parcial seguida de separación por filtración de las fracciones sólidas y líquidas

- Usada para aceites de palma, palmiste, babassu, coco, grasa de leche y bovina.

Fritura

aceite 180°C

vapor
sust. volátiles

- El aceite es consumido con el alimento
- Fenómeno de superficie
- Renovación del aceite
- La absorción de aceite y el deterioro aumenta con el tiempo de fritura
- Temperaturas < óptima, aumentan la absorción de aceite

Contenido de ácidos grasos trans: 0 - 35 %

Aceites y grasas para fritura industrial

CAA: son los aceites y grasas utilizados en la producción industrial de alimentos fritos

- **Aditivos:**
 - **Obligatoriamente contener Antioxidantes**
 - **metilsilicona**
- **Ácido linolénico < 2%**

No aptos para consumo:

- **Cualidades organolépticas**
 - **olor, color, sabor, turbidez**
- **Punto de humo < 170° C**
- **Acidez libre mayor de 2,50 mg KOH/g (1,25% como ácido oleico)**

Elaboración margarinas: 2 fases

Acuosa:

leche entera /descremada
fluida / polvo (+ cultivos lácticos)
+ saborizantes (diacetilo)
+ conservantes (sorbato,
benzoato 1g/kg)
+ antioxidantes
+ Na Cl
+ ENN (max. 2 %)
+ suero, albúmina, caseína

Grasa:

grasa vegetal o animal parc.
hidrogenada con curva
dilatométrica similar
manteca
+ingredientes liposolubles:
tensoactivos
lecitina 0,2 %
vitaminas
col: carotenos, rocú

Agregado fase acuosa a oleosa:

emulsificación → enfriado → envasado

Shortenings: Aceites o grasas procesadas que:

- **afectan palatabilidad, apariencia, calidad de almacenamiento, flavor, estabilidad**
- **y proporcionan: emulsificación, lubricación, estructura, aireación, barrera a la humedad, medio para flavor, transferencia de calor**

Clasificación:

- **semisólidos o plásticos**
- **líquidos / líquidos a granel**
- **escamas o polvos**

Aplicaciones:

- **pan, galletitas dulces, crackers, donuts, hojaldre, tortas, rellenos, cremas, frituras, rociado, caldos y sopas, helados, coberturas, chocolates**